TALLERES INTEGRADOS III



Laíz Lissette Bello Tejeda. Exp: 411

Presentación del caso

- **Motivo de consulta:** Mujer de 64 años que acude a consulta por metrorragia vaginal postmenopáusica.
- **Anamnesis:** Fórmula Obstétrica 2-0-2-2-2, menarquia a los 10 años y menopausia a los 54 años. Diagnóstico de útero polimiomatoso en 2004 que debutó con metrorragia y operación en 2014 de linfoma no Hodking, estando pendiente de tratamiento quimioterápico. Actualmente, la paciente consulta por metrorragia postmenopáusica (menopausia a los 54 años) desde agosto de 2014 que ha ido progresando hasta hacerse casi diaria.
- **Exploración física:** en la exploración con ecógrafo se observa endometrio de 12 mm de grosor y útero polimiomatoso.

Ante la clínica referenciada, se realiza histeroscopia con toma de biopsia y RMN.

Imágenes






A-S-R
R-P
L-A
P-I-L


A-S-R
R-P
L-A
P-I-L

Diagnóstico

En la RMN se vio: masa endometrial predominantemente localizada en cara anterior del útero, polilobulada de difícil medición que afecta a todo el espesor del miometrio y que presenta extensión a nivel periuterino.

En histeroscopia y biopsia se determinó: **adenocarcinoma de tipo endometroide** con metaplasia escamosa