

TALLERES INTEGRADOS III

Diagnóstico a primera vista

Javier Gimeno Pérez
Curso 2014-2015

ENFERMEDAD ACTUAL

Hombre de 60 años de edad que acude por presentar ictericia de piel y mucosas de una semana de evolución, así como pérdida de peso de alrededor de 20 Kg en los últimos meses. Coluria. Acolia. Prurito. No dolor abdominal ni lumbar.


Fumador de 70 años/paquete

ABDOMEN: blando y depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Presenta hepatomegalia de 4-5cm y masa en fosa iliaca dcha. homogénea no dolorosa. No ascitis.

ANALÍTICA DE SANGRE:

BILIRRUBINA TOTAL *18,53 mg/dl, GOT 110, GPT 150, GGT 73, FA 286.
Marcador tumoral Ca 19.9: 573,48.

PRUEBAS DE IMAGEN DIAGNÓSTICA



PRUEBAS DE IMAGEN DIAGNÓSTICA



DIAGNÓSTICO:

- Neoplasia de cabeza de páncreas
- Ictericia obstructiva secundaria

TAC ABDOMINO-PÉLVICO CON CONTRASTE INTRAVENOSO:

Páncreas de pequeño tamaño, con una lesión localizada a nivel cefálico, con un diámetro máximo de 23mm, mal definida, hipodensa, que provoca una dilatación retrógrada de la vía biliar intra y extrahepática (colédoco de 20mm) y del conducto pancreático principal, sospechosa de neoplasia primaria. Calcificación puntiforme en el interior de la masa.

La lesión contacta con estructuras vasculares (arteria y vena mesentérica superior), sin poder descartar infiltración.

* Se recomendó valoración mediante ecoendoscopia.