

Carcinoma Pulmonar

Carlos Grau Polo

Motivo de consulta

- Paciente de 57 años que acude por empeoramiento de su disnea basal desde hace tres meses, hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Empeoramiento severo disnea basal

Proceso Actual

- Empeoramiento severo disnea basal
- aumento de tos y expectoración espesa, blanquecina de 250 cc/día con ocasionales estrías hemoptoicas.
- Odinofagia y dolor en hemitórax derecho tipo pinchazo, continuo, irradiado a cervical y hemicraneal derecho de 3 meses de evolución

Exploración física


- Destaca FC 111 lpm.
- Acropaquías en manos y pies
- Mvc
- Orofaringe eritematosa sin placas de exudado
- Dolor a la palpación de espinosas cervicales y musculatura
- Crepitantes tercio inferior derecho. Roncus espiratorio en ambos campos medios y base izquierdo

Pruebas Complementarias


- FVC 3,01 (74%), FEV₁ 1.89 (58%)
- FEV₁/FVC 63%
- Peso 98 kg
- Altura 170 cm

Pruebas Complementarias- Rx Tórax

Se:1
Im:1



Pruebas Complementarias- Rx Tórax



Diagnóstico definitivo

- Carcinoma Pulmonar estadio IV