TALLERES INTEGRADOS III

Caso clínico
Antonio Montilla Ibarra N^o.: 283

<<Servicio de Neumología>>

- **Motivo de consulta:** MEG
- **Antecedentes personales:** No RAMc, HTA, Dlp, no DM.
 - Fumador 100 años paquete
 - Infarto hemiprotuberancial derecho
 - Depresión en seguimiento por MAP
 - Seguimiento por Urología por elevación de PSA
 - IQx: Cataratas
 - Tto habitual: Omeprazol, noctamid, Diazepam, Adiro
 - Situación basal: leve DAVD

- **Enfermedad actual:** Varón de 74 años que acude a URG por aumento de disnea habitual para pequeños esfuerzos, aumento de nicturia y edemas en MMII, junto con tos y expectoración. No fiebre, no sdme miccional. Refiere empeoramiento del déficit neurológico con disminución de la fuerza.
- **Exploración física:** Normotenso, afebril, Sat. O₂: 975 (g.nasales a 2lpm).
- C y O, NH, NC. Eupneico en reposo.
- AC: rítmica, sin soplos ni roces.
- AP: MV disminuido globalmente. Crepitantes basales, sibilantes dispersos.
- Abdomen: sin alteraciones
- No presenta edemas en la exploración, no TVP. Pulsos periféricos conservados.
- Leve disartria, leve hemiparestesia izquierda.

Rx Tórax

TAC toracoabdominal

TAC toracoabdominal

TAC toracoabdominal

TAC toracoabdominal

TAC toracoabdominal

TAC toracoabdominal

TAC toracoabdominal

• **Exploraciones complementarias:**

- A.S.: sin alteraciones relevantes.
- ECG.: RS a 65 lpm, no alteraciones repolarización.
- Rx Tórax: Masa en LSD de 3,3 cm sugestiva de neoplasia. Atelectasia en LII subsegmentaria.
- TAC toracoabdominal: neoplasia pulmonar segmento apical LSD.
- TAC craneal: hipodensidad en protuberancia derecha por secuela de lesión isquémica previa. Infartos lacunares en ganglios basales bilaterales.
- Broncoscopia: recogida de muestras.

Posibilidades diagnósticas (diagnóstico diferencial) : MASA PULMONAR ÚNICA

- Causas congénitas
 - Quiste broncogénico
 - Secuestro pulmonar
- Infecciosas
 - Neumonía redonda
 - Granulomas tuberculosos
 - Histoplasmosis
 - Blastomycosis
 - Coccidiomycosis
 - Aspergiloma

Posibilidades diagnósticas (diagnóstico diferencial) : MASA PULMONAR ÚNICA

- Neoplásicas
 - Carcinoma epidermoide, de células grandes, microcítico, adenocarcinoma.
 - Benignos: adenoma y carcinoide
 - Secundarios: Metástasis únicas: Colon/mama
- Vasculares
 - FAV pulmonar
- Por inhalación y depósito
 - Neumonía lipoidea (aspiración sustancias oleosas como pomadas/gotas nasales, tragafuegos, gasolina)

Posibilidades diagnósticas (diagnóstico diferencial) : MASA PULMONAR ÚNICA

- Inmunológicas
 - Wegener (poliangeitis granulomatosa)
 - Sdme Caplan (neumoconiosis reumatoidea)
- **Diagnóstico principal:** Masa pulmonar a estudio

Pruebas a realizar

- TAC (extensión)
- A. Sanguínea (marcadores tumorales)
- Broncoscopia (biopsia transbronquial)
- PAF

- Exploración funcional respiratoria (patrón obstructivo)
- Eco cardio (insuficiencia cardíaca)

Muchas Gracias por la
atención!!