

Juan Luis Fayos Jordán

TALLERES INTEGRADOS

CASO 2

Motivo de consulta

- Varón de 64 años
- Dolor en epigastrio irradiado a ambos costados y a la espalda
- Vómitos
- Afebril



A.P. y Exploración física relevantes

- Alergia a amoxicilina
- **Ictericia** en piel y conjuntiva
- **Abdomen blando, doloroso en epigastrio e hipocondrio derecho con defensa a la palpación.**



Exploraciones complementarias.

Analítica sanguínea

- AST/GOT 464, ALT/GPT 334
- Bilirrubina total 4,66 mg/dL, bilirrubina directa 4,05 mg/dL, bilirrubina indirecta 0,61 mg/dL
- Amilasa 43
- PCR 4
- Leucocitosis, neutrofilia

Exploraciones complementarias.



Exploraciones complementarias.

TAC

- ⦿ Moderada dilatación de la vía biliar intrahepática y más importante de la vía biliar extrahepática.
- ⦿ Colédoco dilatado con diámetro de hasta 2,2 cm y áreas nodulares en su interior que simulan litiasis.
- ⦿ Vesícula biliar distendida con colelitiasis, pero sin signos inflamatorios.
- ⦿ No absceso hepático, páncreas sin cambios inflamatorios, leve esplenomegalia.

**COLELITIASIS, COLEDOCOLITIASIS
CÓLICO BILIAR**