

NEUMONÍA EN LÓBULO MEDIO

Pablo Peñalver Calero N° Exp: 928

Grupo: 7-8

Hospital General Universitario de Elda

Motivo de consulta

- Mujer de 75 años que acude a Urgencias por dolor en hemitórax derecho y tos sin expectoración. No disnea.

Antecedentes personales


- No hábitos tóxicos. HTA y DLP. Insuficiencia venosa crónica. Incontinencia urinaria.

Exploración física

- La paciente se muestra consciente, orientada y afebril (37°C). Fc 93lpm. Saturación de O₂ 90%. TA 100/55mmHg.
- Auscultación pulmonar: crepitantes en ambos campos pulmonares, más acentuados en tercio medio derecho.
- Auscultación cardíaca: normal.
- Palpación abdominal: no dolorosa, sin masas ni megalias.
- Extremidades inferiores: signos de insuficiencia venosa de predominio en miembro inferior derecho.

Pruebas complementarias

- **Analítica sanguínea:** leucocitos 21.400/mm³, neutrófilos 93,3%, PCR 235,8 mg/L. Hb 14,2 gr/dL, Hto 44,9%.
- **Antigenuria en orina:** negativo para Neumococo y *Legionella*.
- **Rx tórax PA y lateral:** se muestran a continuación.



F.N. : 03-Aug-1940
RX TORAX PA Y LAT
bucky LAT
Se:2
Im:1

21-F

R



Descripción de imágenes

- En las pruebas radiográficas observamos un aumento de densidad en lóbulo medio derecho compatible con proceso neumónico.

Diagnóstico

- **Diagnóstico específico:** neumonía en lóbulo medio derecho.