

DOLOR ABDOMINAL e ICTERICIA

**TALLERES INTEGRADOS III
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
HOSPITAL DE ELDA**

Raúl Candela Payá


Caso clínico

* Motivo de consulta:

Varón de 26 años con cuadro de **dolor en flanco y fosa ilíaca derecha** que irradia a epigastrio junto con **ictericia mucocutánea**


* Analítica sanguínea:

AST: 265 U/l, ALT: 442 U/l,
Bilirrubina total 6,30 mg/dl



Caso clínico

* ECO ABDOMINAL




Se observa lesión hiperecoica en vesícula biliar con sombra acústica, compatible con una litiasis

Conclusión: **Colelitiasis** sin signos de colecistitis

Caso clínico

* COLANGIO RMN



Se observan múltiples litiasis en vesícula biliar y una lesión hipointensa en el conducto colédoco compatible con litiasis

Conclusión:

Hallazgo compatible con **colelitiasis** y **coledocolitiasis**

Caso clínico

- * **Diagnóstico:**

Cólico biliar complicado secundario a
coledocolitiasis

- * **Tratamiento:**

**Colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica (CPRE) y colecistectomía**