

Caso Clínico ORL



María del Mar Ponce Abellán
Hospital General Universitario de Alicante
Talleres Integrados III
Imágenes aprobadas por el Dr. Severá



Motivo de consulta

- Mujer de 75 años remitida por Hematología en estudio por mieloma múltiple a la que se realiza TAC cérico-toraco-abdomino-pélvico para estudio de extensión y se detectan **bultomas mandibulares bilaterales no dolorosos** en exploración física. Refiere una pérdida de peso de unos 10 Kg en el último año y anorexia.



Exploración física

- Aumento del volumen laterocervical en ambos lados.
- Se palpan **bultomas bilaterales** a nivel de la cola de las **glándulas parótidas**.
- Adenopatías cervicales dudosas.
- **TAC previo:** múltiples **nódulos parotídeos bilaterales** localizados en ambos lóbulos superficiales parotídeos, el mayor de 21 mm en el lado derecho con algún foco de necrosis en su interior.



TAC (cortes cervicales)



R



100

mm



Pruebas complementarias

- **BAG guiada por ECO:** extracción de dos cilindros de nódulos parotídeos derechos.
- Informe anatomopatológico: cistoadenoma papilar con estroma linfático (TUMOR DE WARTHIN)

Diagnóstico: TUMOR WARTHIN

Tratamiento: PAROTIDECTOMÍA

