

Banco de imágenes Talleres III HGU de Elda. UEI Caso 1

Nerea Aranda Palomo

Caso aprobado por Reyes Pascual

Mujer de 57 años

- ▶ **Motivo de consulta:** Malestar general
- ▶ **Antecedentes personales de interés**

Esclerosis Múltiple (diagnosticada hace 17 años)

Adenoma tiroideo productor de hormonas tratado con radioyodo en 2013.

Situación basal: Barthel 85/100. Movilidad reducida. Camina 50 m sin ayuda de andador y realiza algunas actividades sencillas como vestirse y asearse. No O2 domiciliario.

Tratamiento habitual: Olmesartán medoxomil 10mg 1c/24h, sulfato ferroso 100mg 1 cápsula7 24h, zolpidem 10mg 1c/24, Paracetamol a demanda.

Antecedentes familiares: Hermano diagnosticado de cáncer de pulmón a los 55 años.

► ENFERMEDAD ACTUAL


Mujer de 57 años que acude a urgencias hospitalarias por mal estado general los 3-4 días previos acompañado de sensación de mareo sin náuseas ni vómitos. La paciente además refiere percibir mucosidad faríngea. No tos ni expectoración. No fiebre termometrada. No dolor torácico. No refiere alteraciones de hábito miccional ni de las deposiciones. Nos comenta síndrome constitucional con una pérdida de peso de 6-7 kg con 7 meses de evolución.

► PRUEBAS COMPLEMENTARIAS


Gasometría arterial: PH 7.47, PCO₂ 29 , PO₂ 53 , HCO₃ 21,1 , Sat O₂ 90 %, Lactato 26 mmol/l.

Analítica sanguínea PCR 124,7 mg/l

- PCR virus respiratorios: virus influenza A positivo
- Cultivo de esputo: Se observan cocos Gram (+). *Staphylococcus aureus*, MS. *Candida Krusei* , <10 cél epiteliales/campo 100x. ≥25 leucocitos/campo 100x.




Rx al ingreso
En decúbito



Rx 7 días tras el ingreso
En decúbito

El día 13 tras el ingreso hay un empeoramiento clínico de la paciente. Ella refiere malestar general y en la exploración física se objetiva una **abolición del murmullo vesicular** en la mitad inferior del hemitórax derecho.



- Toracocentesis diagnóstica: leucocitos 60 L/mmc, hematíes 1.76 H/mmc, Glucosa 95 mg/dl, proteínas <2g/dl, pH 7,518, **LDH 94 UI/L (190 LDH sérico)**, ADA 8 UI/L. Cultivo de la muestra negativo. En tinción gram se observan aislados PMC →Trasudado. Derrame no complicado





► Diagnóstico

Gripe A

Neumonía bacteriana secundaria por S.aureus

Derrame pleural paraneumónico.

Insuficiencia respiratoria aguda con alcalosis respiratoria.