



# TALLERES INTEGRADOS III

## CASO CLÍNICO I

SERVICIO DE DIGESTIVO  
Hospital General Universitario de Elche

Aprobado por Dra. M.<sup>a</sup> Dolores Picó

Cristina Isabel Davó Pérez  
Grupo 1-2

## MOTIVO DE CONSULTA

Dolor en hipocondrio derecho

## ANAMNESIS

- ANTECEDENTES PERSONALES

- No RAM
- No HTA, no DM, DLP
- Hábitos tóxicos: fumador 70 años-paquete
- CV: IAM ínferoposterolateral con ACTP + Stent (2012)

- TTO HABITUAL

- Atorvastatina 40 mg
- Fenofibrato 160 mg
- Bisoprolol 2,5 mg
- AAS 100 mg

## ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente varón de 57 años que acude a Urgencias por dolor en HD de 12 horas de evolución asociado a náuseas, coluria e ictericia cutáneo-mucosa. Refiere presentar un episodio/mes de dolor en HD desde hace 1,5 años. No fiebre termometrada, sí distermia.

## EXPLORACIÓN FÍSICA

T<sup>a</sup>: 36,7 °C    FC: 63 lpm    FR: 17 rpm    TA: 115/62 mmHg    Sat O<sub>2</sub> basal: 99%

- BEG, C y O en las 3 esferas, NH, NP e ictericia cutáneo-mucosa
- AC: rítmico sin soplos
- AP: MVC sin ruidos sobreañadidos
- ABD: blando y depresible, dolor a la palpación en HD, Murphy +, no irritación peritoneal, no masas ni megalias, peristaltismo conservado.

## PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- AS: Bilirrubina total 7,20 mg/dl\* [0.20-1.30], GOT/AST 260 U/L\* [17-59], GPT/ALT 302 U/L\* [21-72], GGT 320 U/L\* [15-73], FA 422 U/L\* [38-126], PCR 147.3 mg/L\* [< 5.0], Leucocitos 18.98 · 10<sup>3</sup>/μL\* [4.00-11.00], Neutrófilos 89.7%\* [37-72], Lactato 2.3 mmol/L\* [0.7-2.1].
- AO: Bilirrubina ++, Urobilinógeno +++.
- RX ABD: Luminograma inespecífico
- ECO ABD
- COLANGIO-RM

## ECO ABD

[A]




[B]



Dilatación vía biliar intra y extrahepática, colédoco con dilatación de hasta 13 mm que continúa hasta su porción distal, donde se identifican al menos 3 imágenes ecogénicas en su interior (la mayor de 12 mm), compatible con coledocolitiasis. [A]


Colelitiasis sin signos inflamatorios. [B]

# COLANGIO-RM



Colelitiasis sin signos de  
colecistitis.  
Múltiples coledocolitiasis  
y dilatación vía biliar.

[A - Colangiografía]



[B - RM]

# DIAGNÓSTICO

## COLEDOCOLITIASIS COMPLICADA A COLANGITIS

# TRATAMIENTO


- FARMACOLÓGICO:
  - Piperacilina/Tazobactam 4/0,5g IV/8h
  - Metrocloramida IV/8h
  - Metamizol IV/8h
- CPRE:



PAPILA



COLANGIOGRAFÍA



CÁLCULO