Caso patología de las enfermedades infecciosas

Caso aprobado por la dra. Mar masía

Maria mateo luna

Grupo 5-6

Hgu de elche

- ▶ **Motivo de consulta:** diabetes mal controlada.
- ▶ **Enfermedad actual:** varón de 43 años con nacionalidad marroquí que acude a urgencias por cuadro de astenia intensa, disnea y edema en MMII de una semana de evolución. Anteriormente, refiere un cuadro similar que se diagnosticó en otro hospital de cetoacidosis diabética que se resolvió farmacológicamente.
- ▶ **Antecedentes personales:**
 - no RAMc
 - Diabetes mellitus insulina-dependiente: tratamiento actual Lantus 0-0-34 que no cumple.
 - Sin otros hallazgos de interés.

► **Exploración física:**

- Glucemia 431, afebril, normotenso y saturación de oxígeno 99%.
- Regular estado general, consciente y orientado, con impresión de desnutrición.
- ACP: sin ruidos patológicos.
- Abdomen blando y depresible, peristaltismo conservado, sin hallazgos patológicos.
- MMII: edemas sin fóvea hasta ambas rodillas.

► **Pruebas complementarias:**

- Gasometría: pH 7.326 (ligeramente ácido), pCO₂ 35.9, pO₂ 25.6, bicarbonato 18.8, glucosa 371, sodio 130, calcio ionizado 5.2, lactato 0.9.
- Analítica sanguínea: PCR 51.3, creatinina 0.45, en hemograma no hay hallazgos de interés.
- Urianálisis normal.

Rx de tórax

Tac torácico

Pruebas complementarias

Se realiza tinción de Ziehl-Neelsen del esputo y pide cultivo del esputo.

- ▶ Rx de tórax: infiltrados a nivel del lóbulo superior izquierdo.
- ▶ Tac torácico: lesiones cavitadas en lóbulo superior izquierdo con adenopatías mediastínicas sobretodo izquierdas.

▶ **Diagnóstico:** tuberculosis pulmonar

▶ **Tratamiento:**

1- Aislar al paciente.

2- Iniciar estudio de contactos.

3- Antibioterapia:

- isoniacida + rifampicina + piracinamida + etambutol durante 2 meses.

- isoniacida + rifampicina durante cuatro meses más.