


# TALLERES INTEGRADOS III

## CASO CLÍNICO

### GINECOLOGÍA

Sergio Morales Gabriel  
Hospital General Universitario de Alicante  
Aprobado por el Dr.López  
Grupo 3-4  
Curso 2016/2017



- ▶ **Motivo de consulta:** mujer de 61 años que acude por dolor y pesadez en FID.
- ▶ **Antecedentes:**
  - Antecedentes personales:
    - No alergias. No fumadora. Niega transfusiones
    - Antecedentes familiares: madre con cáncer metastásico y hermano con cáncer de colon
    - Niega enfermedades previas
    - Intervenciones quirúrgicas previas: quiste ovárico en embarazo con extirpación única del quiste; metacarpiano mano derecha
    - Antecedentes obstétricos: G2A0P2 vaginales. FO: 2/0/2/2
    - Antecedentes ginecológicos: M:12 FM: 5/30 Menopausia a los 46 años. En revisiones posteriores nunca hallazgos significativos hasta ahora donde aparece la formación quística de ovario derecho. Mamografías negativas– Citología negativa.
- ▶ **Enfermedad actual:** la paciente refiere dolor intermitente y pesadez con sensación de masa.
- ▶ **Exploración física:** genitales externos atróficos. Vagina atrófica. Cérvix atrófico retraído.

# Pruebas complementarias

- ▶ **Analítica + Ecografía TV**
  - ▶ Analítica: CEA, CA 19.9, CA 125 y VSG normales. No anemia.
  - ▶ Ecografía TV: a continuación
- 

# ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL



- ▶ Eco: útero de 7x4x5 con LE < 4 mm y con ovario izquierdo no apreciante. En OD, hay una imagen sonoluscente de 8x7x7 con ausencia de vascularización y compatible con C.A.seroso. No hay tabiques ni papilas.
- ▶ **Diagnóstico:** quiste de paraovario derecho
- ▶ **Tratamiento:** laparoscopia y anexectomía bilateral