

**TALLERES
INTEGRADOS III**

BELINDA SANTONJA FERNÁNDEZ (1465)

CASO CLÍNICO

Mujer de 48 años que acude a Consulta en Centro de Salud porque nota un bulto a nivel ganglionar en el lado izquierdo.

- No refiere ningún tipo de síntoma
- No fumadora; no RAMc; no HTA; no DLP; no DM


En Consulta Primaria le comunican que probablemente se trate de un ganglio inflamado, pero que de todos modos procederían a petición de pruebas complementarias.

TC CUELLO CON CONTRASTE
Cuello 2,00 Br40 S2
Se:2
Im:99

R

A

L



P

HA

Primario
Hospital General Alicante

TC CUELLO CON CONTRASTE

Batch 1

Se:201

Im:12

RA

LP



H
A
R
F

FP

ST/SP:1.4934346724337


Q 2.1
WL:60 - WW:248

TC CUELLO CON CONTRASTE
Batch 2
Se:202
Im:8

A

H

P



ST/SP:1.4934346724337

2.1
WL:54 - WW:233



Ecografía de cuello



Nódulo cervical nodulado en lado izquierdo de 19mm localizado en el nivel ganglionar I I^a izquierdo, entre glándula submaxilar y la cola parótida. Probablemente dependa de alguna de estas glándulas. Menos probable que corresponda a una adenopatía.

Exploración



Nódulo de menos de 2cm. Móvil. Situado en celda submaxilar izquierda. Sin adherencias. Consistencia elástica.

✓ **Diagnóstico:** Tumor mixto de glándula salivar (sin sospecha maligna)